

146例强奸案受害者的案例分析

郭新宇^① 郭捧艳^② 吴振国^① 郭丰秀^① 崔卫华^① 牛素英^①

【摘要】目的 分析重男轻女观与强奸案受害者的精神疾病。**方法** 146例接受精神疾病司法鉴定的被强奸案中的女性受害者,因重男轻女观思想,犯罪人选择患有不同精神疾病者为主要性迫害对象,及强奸案发生后对受害者和家庭的影响。**结果** 146例中有精神发育迟滞121例,精神分裂症15例,情感性精神障碍4例(其中抑郁发作3例,躁狂发作1例),器质性疾病所致精神障碍5例(其中痴呆2例),1例无精神疾病。**结论** 重男轻女观是导致犯罪人选择有精神疾病者作为主要强奸对象的关键,其中精神发育迟滞者所占比例最高。

【关键词】 重男轻女观;强奸案;精神疾病司法鉴定;性迫害

Gose Analysis on 146 Rape Victims. Guo Xinzi, Guo Pengyan, Wu Zhenguo, et al. Department of Mental Health, The First Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang 050031, P. R. China

【Abstract】Objective To analyze the relationship between preference for boys over girls and psychiatric disorders of rape victims. **Methods** A total of 146 cases of women rape victims who accepted judicial testing were evaluated for psychiatric disorders and preference for boys and girls. In addition, the effect of rape victims and their families were also evaluated. **Results** A total of 146 cases of subjects were composed of 121 patients with mental retardation, 15 patients with schizophrenia, 4 patients with affective disorders (3 depressive episode and 1 manic episode patients), 5 patients with organic mental disorders (2 dementia patients) and 1 person without any mental disorders. **Conclusion** Preference for boys over girls is one of the key factors of rape objects chosen, among which patients with mental retardation are of the highest percentage.

【Key words】 Preference for boys over girls; Rape; Forensic psychiatric evaluation; Sex persecution

重男轻女观是社会问题,表现在许多方面,精神疾病司法

鉴定^[1]中的强奸案件充分体现了重男轻女观者无视女性的人

无显著性,治疗1,2,6周时,两组HAMD评分比治疗前显著下降,而观察组下降更为显著,见表1。

了有精神病性症状的抑郁症,从而排除了因喹硫平对精神病性症状的治疗作用而引起的抑郁好转的情况,进一步证明了喹硫平对抑郁症的治疗效果。荟萃分析也证明喹硫平联合抗抑郁药可显著提高疗效^[4]。

表1 两组HAMD评分比较($\bar{x} \pm s$)

时 间	单用组(n=28)	合用组(n=30)	t	P
治疗前	28.01±4.31	28.03±4.92	0.47	>0.05
治疗1周	23.06±4.02*	19.69±4.70*	4.31	<0.01
治疗2周	16.78±3.92*	14.23±4.10*	3.56	<0.01
治疗6周	8.02±1.93*	3.90±5.12*	3.82	<0.01

注:与治疗前比较,* $P < 0.01$

本研究结果表明喹硫平在无精神病性症状的抑郁症中有很好的疗效,两组差异有显著性,且观察组起效快,在治疗后1周末HAMD总分明显优于单用文拉法辛组。两组TESS总分及各因子分比较无显著性差异,加用喹硫平后并未增加不良反应的发生率,对锥体外系症状、体质量、血脂、血糖等方面影响不大,说明合用小剂量喹硫平不会增加明显的药物不良反应。故我们认为单用抗抑郁药疗效较差的抑郁症患者,合用小剂量喹硫平疗效确切,安全性高,值得临床使用。

2.3 不良反应 两组TESS评分差异均无统计学意义(P 均 >0.05)。观察组10例(34.48%)其中口干、恶心呕吐各3例,头晕、便秘、嗜睡及视物模糊各1例。对照组12例(41.38%),其中口干4例;恶心呕吐和视物模糊各2例;嗜睡、头晕、便秘、腹泻各1例。均为较轻,对症处理后逐渐缓解,而实验室检查均无异常发现。

3 讨论

近几年来抑郁症的疗效在合并使用非典型抗精神病药如喹硫平、利培酮、奥氮平等中得到极大的提高。喹硫平用于抑郁症的联合或辅助治疗已受到人们的重视^[3],抗抑郁药联合喹硫平可达到单一抗抑郁药所不能达到的效果。本研究排除

4 参考文献

- [1] Knopf U, Hubrich-ungureanu P, Thome J, et al. Augmentation with risperidone in therapy-resistant depression [J]. Psychiatrprax, 2001, 28: 405-406
- [2] Michael E Thase. What role do antipsychotic drugs have in treatment-resistant depression [J]. Clin Psychiatry, 2002, 63: 95-103
- [3] 孙全新, 曾德志, 胡飞达. 喹硫平对精神病性抑郁症治疗的增效作用 [J]. 临床精神医学杂志, 2007, 17: 173-174
- [4] 刘兰英, 马永春, 金卫东, 等. 喹硫平联合抗抑郁药物治疗抑郁症对照研究的Meta分析 [J]. 循证医学, 2008, 8: 100-105

(收稿时间: 2011-04-06)

身权利,选择女性作为性迫害对象,尤其选择有精神疾病的女性患者多见,因精神疾病患者辨认能力和自我保护能力下降,当出现被恐吓、利诱等情况时,被强奸女性处于不能、不敢、不知反抗的状态。

强奸案属于性暴力行为,是违背妇女意愿实施的强迫性的性行为。精神疾病在目前临床中分类复杂多样,症状也有很大变异,至今也只是控制症状,延缓衰退进度,还没有很好的方法达到完全治愈,多年临床验证已经证明精神疾病患者认知功能受损,缺乏分辨力和自我保护能力,已经引起有重男轻女观的犯罪人的注意,发生强奸案也在所难免,甚至多次发生强奸或者轮奸行为,有些强奸案中的当事人双方考虑到各方面的原因,尤其与犯罪分子是邻里关系,要面子,怕丢人,有的私了,有的被家人发现告发,甚至受害者怀孕后在家人追问下才知道继而告发。近年来在精神疾病司法鉴定案件中,强奸妇女案有逐渐上升的趋势,强奸案发生后进行精神疾病司法鉴定的多是有精神残疾的女性受害者,强奸案对受害者本人的心身损害和影响是非常严重的^[1]。认识强奸案件背后的心理动机,如何预防强奸案的发生,降低强奸案的发生率,关键是提高精神疾病患者本人和家人的保护意识,且通过宣传让更多的女性学会自我保护,必要时能做到如何求助于外援减少被伤害,关键是提高公民的法律意识,提高尊重妇女的合法权利的意识。

1 对象与方法

1.1 对象 案例选择 2007 年 1 月—2009 年 12 月在河北医科大学第一医院精神卫生研究所精神疾病司法鉴定中心接受精神疾病鉴定的 146 例被强奸案的受害者。均符合《中国精神障碍分类与诊断标准》第 3 版(CCMD-3)^[2]中精神发育迟

滞、精神分裂症、情感性精神障碍、器质性疾病所致精神障碍的诊断标准。所有案例均有完整的鉴定书面记录资料、以往的精神疾病治疗记录、或对被鉴定者详细的调查材料、量表检查记录及相关检查。

被强奸后进行精神疾病鉴定的 146 例受害者均为女性;年龄 8~72 岁(除 19 例年龄不详),平均年龄(27.3±9.8)岁,其中 8~10 岁 2 例(占 1.4%),11~20 岁 50 例(占 34.2%),21~30 岁 35 例(占 24.0%),31~40 岁 24 例(占 16.4%),41~72 岁 16 例(占 11.0%);受教育年限(1.2±3.5)年(除 10 例不详);被强奸后(1.3±8.4)天(除 8 例不详)后接受精神疾病鉴定。

1.2 统计方法 应用 SPSS 17.0 软件包进行统计分析。检验水准 $\alpha=0.05$ 。

2 结果

2.1 146 例被强奸后进行精神疾病司法鉴定时的疾病分类

见表 1。146 例精神疾病司法鉴定案中,被鉴定人除 1 例 72 岁老年女性因躯体疾病行动不便被强奸后由其家人发现报案的,其余均用被利诱、欺骗、恐吓等手段实施的强奸,且均是由家人发现、或者因被强奸怀孕的不得以告诉家人,以及因被强奸发生急性应激性反应家人人才得知而进行精神疾病司法鉴定。

2.2 被鉴定人被强奸场所的选择多种多样,但多是选择比较隐蔽的场所,1 例无病者被引诱后轮奸,且发展为急性应激障碍^[3] 至今在河北医科大学第一医院精神卫生科门诊接受治疗,3 例被强奸 2 次以上,其中 1 例被 1 个犯罪人强奸 2 次以上,其余均被强奸 1 次。

表 1 146 例被强奸后进行精神疾病司法鉴定时的疾病分类比较[n(%)]

疾病类型	精神发育迟滞	精神分裂症	情感性精神障碍	器质性疾病所致精神障碍	无病	合计
例数	121(82.9)	15(10.3)	4(2.7)	5(3.4)	1(0.7)	146

2.3 被鉴定人的年龄文化程度 见表 2,3。146 例中 19 例年龄不详,10 例文化程度不详,且均是被收养或被拐卖者;5 例

因发现怀孕后才知道被强奸。可见,被强奸的受害者中精神发育迟滞者、年龄在 11~20 岁的文盲所占比例最高。

表 2 146 例被强奸者的年龄分布情况[n(%)]

年龄(岁)	8~10	11~20	21~30	31~40	41~72	不详	合计
例数	2(1.4)	50(34.2)	35(24.0)	24(16.4)	16(11.0)	19(13.0)	146

表 3 146 例被强奸者的受教育程度

文化程度	文盲	小学文化	初中以上	不详	合计
例数	77	37	22	10	146

2.4 分析 146 例被强奸后接受精神疾病司法鉴定者中的年龄、精神疾病种类、文化程度比较 鉴定者中的年龄、精神疾病种类、文化程度高低差异显著,均有统计学意义($P<0.05$)。

3 讨论

分析接受精神疾病司法鉴定的 146 例的受害者,得出以下结论:精神发育迟滞、精神分裂症、情感性精神障碍、器质性

疾病所致精神障碍及或行动不便者是被强奸的主要受害者,其中精神发育迟滞者在被强奸案例中所占的比例高于其它精神疾病患者,文盲者所占比例最高,年龄越小被强奸的比例也越高。

加强法制宣传教育,尤其偏远地区的法制宣传,形成人人知法、懂法、守法的良好社会氛围,普及农村初等教育,提高农民文化素质。在中小学教育中重视思想品德、法制教育课,树立正确的贞操观念、自爱自强的观念,提高学生遵纪守法意识和自我保护意识,教师也要对学生加强男女平等观念的教育,尊重女性。加强家庭教育理念,让女孩接受与男孩相同的教育,对未成年少女要教育其不贪小便宜,多关心其饮食起居,

齐拉西酮替换氯氮平治疗精神分裂症 50 例临床观察

封正敏^①

【摘要】 目的 观察齐拉西酮替换氯氮平治疗精神分裂症的临床疗效及不良反应。**方法** 选取我院 50 例既往服用氯氮平的精神分裂症患者替换为齐拉西酮治疗 16 周。分别于服齐拉西酮前及服药后 2, 4, 6, 8, 12, 16 周末采用简明精神病评定量表(BPRS)评定疗效, 服药第 16 周末采用副反应量表(TESS)评定不良反应。**结果** 患者治疗后 6, 8, 12, 16 周简明精神病评定量表总分较治疗前显著下降($P < 0.05$ 或 0.01)。其中 45 例患者成功替换为单剂齐拉西酮治疗。**结论** 齐拉西酮代替氯氮平治疗精神分裂症疗效肯定, 不良反应较少, 患者的认知功能得到改善, 服药依从性升高。

【关键词】 齐拉西酮; 氯氮平; 精神分裂症; 简明精神病评定量表

Clinical Efficacy Study on Ziprasidone Alternated to Clozapine for 50 Schizophrenia Patients. Feng Zhengmin. The Second People Hospital, Chuxiong 675000, P. R. China

【Abstract】 Objective To explore the efficacy and side effect of Ziprasidone substitutes chlorine nitrogen for schizophrenia patients. **Methods** A total of 50 patients with schizophrenia took medicines from Clozapine to Ziprasidone 16 weeks. Adoption Brief Psychiatric Rating Scale and Treatment Emergent Symptom Scale to assess efficacy and bad reaction respectively before taking Ziprasidone and 2, 4 ws, 6 ws and 8 ws, 12 ws and 16 w end and in 16 w end to adopt the Treatment Emergent Symptom Scale (TESS) to assess side effect. **Results** The scores of BPRS in 6 ws, the 8 ws, 12 ws and 16 w after treatment were significantly lower than before treatment ($P < 0.05$ or 0.01) 45 among the sufferers successfully substituted for the list to Ziprasidone treatment. **Conclusion** Ziprasidone has a good efficacy and low side effect, it can improve cognition function and compliance.

【Key words】 Ziprasidone; Chlorine; Schizophrenia; BPRS

氯氮平作为第一个应用于临床的非典型抗精神病药, 由于没有明显锥体外系反应(EPS), 且疗效卓著^[1-3], 特别是对难治性精神分裂症的疗效记录, 其他药物难以逾越, 因此颇受医生和患者家属青睐。国内有研究报道^[4], 氯氮平一直是大多数精神病医院的首选药物, 但氯氮平可引起粒细胞减少、身体质量增加、肥胖、糖、脂代谢异常等不良反应, 增加了心血管病的患病率和病死率, 近年来已受到国内外学者的高度重视^[5]。由于上述的严重药物不良反应, 患者不能再继续服用氯氮平, 换用齐拉西酮治疗。本文对齐拉西酮替换氯氮平做了研究。

1 对象与方法

1.1 对象 选取 2008 年 1 月—2010 年 1 月在我院门诊就诊的患者为研究对象。入选标准: ①均符合《中国精神障碍分类与诊断标准》第 3 版(CCMD-3)精神分裂症诊断标准; ②既往服用氯氮平治疗。现由于各种原因不能继续服用氯氮平者。共入选 50 例, 其中男 27 例, 女 23 例; 诊断: 未定型 28 例, 偏执型 12 例, 青春型 8 例, 其它 2 例; 年龄 17~50 岁, 平均年龄(25 ± 10)岁; 服用氯氮平时间 5 个月~5 年, 平均(18 ± 6)个月; 氯氮平用量($50 \sim 200$) mg/d, 平均(150 ± 100) mg/d。

1.2 方法 50 例患者既往均服用氯氮平, 入组时做血常规、肝肾功、心电图、血糖、血脂检测。入组后开始逐渐减少氯氮平

减少单独活动的机会; 对成年孩子要宣传正确的婚姻观, 随时关注孩子的心理变化, 关心婚姻问题, 防患于未然。让全社会一起共同努力, 建立真正男女平等的和谐社会。

4 参考文献

用量, 同时增加齐拉西酮口服。氯氮平平均减 $12.5 \sim 25$ mg/w, 当氯氮平减至 25 mg/d 或 12.5 mg/d 时用苯二氮卓类药物如: 阿普唑仑、氯硝西泮等帮助睡眠, 在 4 周内彻底换完。第 5 周后单用齐拉西酮 $10 \sim 20$ mg/d 开始治疗, 每 3 天增加 20 mg, 在 4 周内增至 $60 \sim 120$ mg/d。分别于入组时及服齐拉西酮第 2, 4, 6, 8, 12, 16 周末采用 BPRS 评定疗效, 入组时及第 16 周末采用 TESS 评定不良反应。

2 结果

2.1 治疗前后患者 BPRS 总分变化 治疗前患者 BPRS 总分为(39.2 ± 9.4)分, 治疗后 2, 4, 6, 8, 12, 16 周分别为(37.4 ± 9.6)、(36.3 ± 8.6)、(34.2 ± 7.7)、(29.2 ± 6.8)、(26.1 ± 4.5)、(21.1 ± 1.5)。治疗后第 6, 8, 12, 16 周总分逐渐减少, 与治疗前比较有显著性差异($P < 0.05$ 或 0.01)。

2.2 治疗前后的不良反应 服用氯氮平时出现的不良反应主要为体重明显增加 35 例、血糖升高 5 例, 粒细胞减少 4 例, 近期发现心脏问题 3 例, 闭经 2 例, 严重流涎、肌张力明显增高 1 例, 经齐拉西酮替换后, 体重未再明显增加, 血糖在用降糖药降糖后未再升高, 粒细胞恢复正常, 心脏未见明显不适, 闭经女性在做人工周期后月经恢复正常。严重流涎, 肌张力明显增高缓解。有 5 例换药后明显烦躁, 头昏、虚弱, 胃肠道副反

[1] 李丛培. 司法精神病学鉴定的实践与理论[M]. 北京: 北京医科大学出版社, 2000: 3-5, 69

[2] 中华医学会精神分会. 中国精神障碍分类与诊断标准[M]. 3 版. 济南: 山东科学技术出版社, 2002: 95-98

(收稿时间: 2011-04-08)